

# Producten & richtlijnen bij euthanasie

## MEDICATIE:

- R/ Midazolam 5mg/ml: 2 amp. van 15mg/3ml
- R/ Diprivan 1x 1g/50ml (2%): **1 voorgevulde spuit en 1 in reserve bestellen** (indien Tiobarbital niet beschikbaar is vanuit het ziekenhuis)
- R/ Fysiologische oplossing (min. 30ml)
- R/ Nimbex: 1 doosje 20mg/10ml waarvan 1 amp.  
Of bij Nimbex 10mg/5ml 2 amp. gebruiken  
Of indien niet in voorraad: R/ Esmeron 50mg/5ml

## MATERIAAL:

- Enkel indien poortkatheter aanwezig:
  - Grippernaald Hubernaald (Port-a-cath naald) van 19G x 19mm
  - Grippernaald Hubernaald (Port-a-cath naald) van 19G x 25mm bij zwaarlijvige patiënten



- Fijn vleugelnaaldje
- Spuit van 20 cc Luer-lock met optreknaald (bij Tiobarbital of Diprivan in flacon)
- 3 spuiten van 10 cc Luer-lock
- 3-weg-kraantje
- Enkele compressen
- Micropore

**Op voorschrift vermeldt men 'Cfr. Wet op euthanasie 2002'**

# Producten & richtlijnen bij euthanasie

## WERKWIJZE:

- Vooraf zakje en/of medicatiekoffertje meenemen:
  - Vleugelnaald of PAC-naald
  - 3-wegkraantje
  - Spuiten van 10 en 20ml
  - Fysiologische oplossing
  - Etiketten om spuiten te labelen
  - Kleefpleister en compres
  - Zakje voor afval
  - Knelband
- Gesprek met patiënt en naasten
- Voorbereiding medicatie in aparte ruimte samen met de arts + spuiten labelen
- Eventueel handdoek vragen om onder de arm te leggen bij aanprikken
- Arts prikt aan (tenzij poortkatheter), wij geven spuiten aan:
  - 10ml fysiologische oplossing bij aanprikken: arts gebruikt meestal niet de hele spuit
  - 6ml Midazolam (30mg)
  - 10ml fysiologische oplossing (zeker bij gebruik van Tiobarbital!)
  - Even wachten
  - Diprivan 2% voorgevulde spuit
  - Even wachten
  - 10ml Nimbex (20mg)
- Arts luistert grondig met stethoscoop, bij onzekerheid i.v.m. overlijden kan er nog extra Nimbex toegediend worden. Bij gebruik van Diprivan kan het een tiental minuten duren vooraleer patiënt effectief overlijdt.
- Afrondend gesprek met familie
- Arts vult overlijdensakte in